

PROYECTO DE INSERTO

MUCOKILL

Guaifenesina 400 mg

Tableta

Lea este inserto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este inserto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este inserto.
- Debe consultar a un médico si empeora o no mejora después de 7 días de tratamiento.

Contenido del inserto

1. ¿Qué es **MUCOKILL 400 mg Tableta** para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar **MUCOKILL 400mg tableta**?
3. ¿Cómo usar **MUCOKILL 400 mg tableta**?
4. ¿Posibles efectos adversos?
5. ¿Conservación de **MUCOKILL 400 mg tableta**?
6. ¿Contenido del envase e información adicional?

1. ¿Cómo usar **MUCOKILL 400 mg tableta** y para qué se utiliza?

MUCOKILL 400 mg tableta está indicado para ayudar a aflojar la flemas (moco) y las secreciones bronquiales delgadas para hacer que la tos sea más productiva para eliminar el moco molesto del conducto bronquial. Bajo condiciones específicas.

Contiene, guaifenesina (un expectorante) fluidifica las flemas, ayudando a eliminar la mucosidad.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar **MUCOKILL 400 mg tableta**?

No tome **MUCOKILL 400 mg tableta** si:

- Si es alérgico (hipersensible) a la guaifenesina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece porfiria, un trastorno metabólico.
- No usar en niños menores de 12 años.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar **MUCOKILL 400 mg tableta**:

- Si tiene o ha tenido problemas de hígado.
- Si tiene tos crónica o persistente, como la tos que se produce en el caso de asma, tabaquismo o en situaciones asociadas a exceso de moco como bronquitis, enfisema (dilatación de los sacos de aire en los pulmones).

Consulte a su médico si los síntomas persisten durante más de 7 días.

Niños y adolescentes

No administrar **MUCOKILL 400 mg tableta** a niños menores de 12 años.

Interferencias con pruebas analíticas:

En caso de que tenga alguna prueba de laboratorio o una prueba de diagnóstico complementaria (análisis de sangre, orina...), dígale a su médico que está tomando MUCOKILL 400 mg tableta porque puede cambiar los resultados. Informe a su médico y deje de tomar este medicamento 48 horas antes de realizar un análisis de orina para detectar ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) y ácido.

Toma de MUCOKILL 400 mg tableta con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Toma de MUCOKILL 400 mg tableta con alimentos, bebidas y alcohol

Embarazo, Lactancia y Fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Tomar medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser supervisado por un médico. La seguridad de la guaifenesina no se ha establecido completamente.

Durante el embarazo y la lactancia, no tome este medicamento a menos que su médico se lo indique.

Conducción y uso de máquinas

Si experimenta somnolencia o mareos, no debe conducir ni utilizar máquinas.

3. ¿Cómo usar MUCOKILL 400 mg tableta?

Tome siempre este medicamento exactamente como se describe en este inserto o como le haya indicado su medicado o farmacéutico. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

La dosis recomendada es:

Posología

- **Adultos y niños mayores de 12 años:** tomar 1 tableta cada 6 horas con un vaso de agua lleno mientras persistan los síntomas. No exceda las 4 dosis en 24 horas.
Dosis diaria máxima 1600 mg.
- **Niños menores de 12 años:** no usar

Población pediátrica

MUCOKILL 400 mg tableta está contraindicado en niños menores de 12 años.

Forma de administración

Oral

Duración del tratamiento

No se recomienda el uso a largo plazo del producto.

Si los síntomas persisten después de 7 días, consulte con un médico. Tome el medicamento según las indicaciones, sin exceder la dosis recomendada.

Si toma más MUCOKILL 400 mg tableta del que debiera

Consulte a su médico de inmediato si accidentalmente ha tomado más tabletas de la dosis recomendada y lleve consigo el envase del medicamento.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda inmediatamente a un centro médico.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Simplemente tome la siguiente dosis como de costumbre.

Si tiene alguna duda sobre el uso de este producto, pregunte a su farmacéutico

4. ¿Posibles efectos adversos?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si usted experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos graves, deje de tomar el medicamento inmediatamente busque ayuda médica urgente si experimenta alguno de los siguientes síntomas, ya que pueden ser signos de una reacción alérgica:

- Dificultad para respirar o tragar
- Hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta.
- Prurito intenso (picor) del cuerpo, con sarpullido o espinillas.

Otros efectos no deseados incluyen: problemas gastrointestinales, incluidos síntomas como náuseas, vómitos y diarrea.

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este inserto. Se les pide a los profesionales sanitarios y a los pacientes usuarios reportar cualquier sospecha de reacción adversa al correo electrónico farmacovigilancia@minsa.gob.pe y farmacovigilancia@gabblan.com.pe. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Composición cualitativa y cuantitativa

Cada Tableta contiene:

Guaiifenesina..... 400 mg

Excipientes c.s.p..... 1 Tableta

Para excipientes, ver *Listado de excipientes*.

Datos farmacéuticos

Listado de excipientes

Celulosa Microcristalina pH 200, Almidón Pregelatinizado de Maíz, Croscarmelosa Sódica, Povidona K30, Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio y Agua Purificada.

6. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en el envase original.

Almacenar a temperatura no mayor de 30° C.

Venta sin receta médica.

Información relacionada a la fecha de expiración

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Advertencia a ciertos signos visibles de deterioro

No use MUCOKILL 400 mg tableta, si observa cualquier signo visible de deterioro.

Precauciones especiales para eliminar el medicamento no utilizado o los restos derivados del mismo

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.



Fabricado por:
Laboratorios GABBLAN S.A.C.